



Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
Jodhpur, Rajasthan



Agromet Advisory Bulletin

Date : 07-08-2020

Weather Forecast of JODHPUR(Rajasthan) Issued On : 2020-08-07(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-08-08	5.0	35.0	26.0	73	40	24.0	230	6
2020-08-09	4.0	34.0	26.0	68	44	26.0	230	7
2020-08-10	8.0	34.0	26.0	66	42	22.0	230	6
2020-08-11	10.0	33.0	26.0	65	37	26.0	230	7
2020-08-12	13.0	32.0	25.0	73	51	25.0	230	7

Weather Summary/Alert:

There is a possibility of cloudy sky and light rain in coming days. आगामी दिनों में बादल छाएं रहने के साथ हल्की वर्षा होने की सम्भावना है।

General Advisory:

To maintain the optimum plant population in pearl millet crop, start thinning and gap filling operations. बाजरा की फसल में पौधों की संख्या समान रखने के लिये आवश्यकता से अधिक पौधों को निकाले व रिक्त स्थानों पर रोपाई करें।

SMS Advisory:

Start hoeing and weeding should be done in pearl millet, green gram, moth, guar, till etc. बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, तिल आदि फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए नराई-गुड़ाई करें।
--

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
PEARL MILLET	Hoeing & weeding is recommended in 3-4 weeks crops of pearl millet crop. Remaining half amount of Nitrogen may be top dressed in crop on rainy day or with irrigation. बाजरा की फसल जिन क्षेत्रों में 3-4 सप्ताह की हो गई है वहाँ नराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाले तथा वर्षा वाले दिन बाजरा में नत्रजन उर्वरक की शेष मात्रा छिटक दें।
GROUNDNUT	To protect groundnut crop from the attack of white grub, use Quinalphos 20 EC @ 4 liter per hectare mixed with soil between the rows on rainy days. मूंगफली की फसल में सफेद लट की रोकथाम के लिए चार लीटर क्लोरपायरिफॉस 20 ई.सी. प्रति हैक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला कर वर्षा के दिन कतारों के बीच में भुरकाव करें।
SESAME (GINGELLY/TIL)	The farmers, whose sesame crop is 4 week old, should be apply Nitrogen at the rate of 20 kg/ha.

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
	तिल की फसल चार सप्ताह की हो गई हो तो नत्रजन की 20 किलो ग्राम मात्रा का प्रति हैक्टेयर में भुरकाव करें।
COTTON	For the control of spotted bollworm attack in cotton crop, spray Fenvalerate 20 EC @ 1 ml per liter water. कपास की फसल में चितकबरी सूड़ी का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए फेनवेलरेट 20 ई.सी. एक मि.ली. प्रति लीटर पानी की दर से छिडकाव करें।
TOMATO	Give 30 kg Nitrogen per hectare in tomato crop at flowering stage along with rain water or irrigation water. टमाटर की फसल में पुष्पन अवस्था पर 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर की दर से वर्षा के दिन या सिंचाई के साथ दें।

Others(Soil Testing/Conservation /Land Preparation Specific Advisory:

Others(Soil Testing/Conservation /Land Preparation(Varieties)	Others(Soil Testing/Conservation /Land Preparation Specific Advisory
GENERAL ADVICE	To protect domestic animals from coming in direct contact with rains. Do not allow water to stagnant in their sheds. Try to keep their litter dry. पालतू जानवरों जैसे गाय,भैंस, बकरी, भेड इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें तथा बिछावन को सुखा रखें।