



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 17 फरवरी 2017

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,  
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	18/02/17	19/02/17	20/02/17	21/02/17	22/02/17
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	33	32	32	32	31
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	17	17	18	18	17
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	3	2	3	2	2
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	70	75	74	72	70
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	21	20	22	23	20
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	4	6	7	5	5
हवा की दिशा	पूर्व	पूर्व- दक्षिण- पूर्व	पश्चिम	दक्षिण	पूर्व- उत्तर- पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
सरसों	पकाव	जहाँ कहीं सरसों की फसल पक गई हो तो किसान भाई सुबह के समय पकी हुई फसल की कटाई करें।
कुष्माण्ड कुल की सब्जियां	बुवाई	कुष्माण्ड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों की निम्न किस्मों की बुवाई करें। लोकी, खरबूजा, तोरई, टिन्डा व तरबूज की उन्नत किस्में निम्नलिखित हैं। <b>लोकी</b> — पूसा समर, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत। <b>खरबूजा</b> — पूसा शर्बती, आर.एम-50, आर.एम-43। <b>तोरई</b> — पूसा नसदार, पूसा चिकनी, अरका सुजात। <b>टिन्डा</b> — बीकानेरी ग्रीन, अरका टिन्डा, टिन्डा लुधियाना। <b>तरबूज</b> — सुगर बेबी, अरका ज्योति। बुवाई के समय 30 किलो नत्रजन, 40 किलो फास्फोरस व 40 किलो पोटैस प्रति हैक्टेयर दें।
जीरा	पकाव	किसान भाई जीरे की फसल में दाना पकते समय सिंचाई ना करें।
मिर्च	नर्सरी	मिर्च की फसल के लिए नर्सरी तैयार करें। एक हैक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करने हेतु एक से डेढ़ किलो बीज प्रयाप्त है। बुवाई से पूर्व 2 ग्राम केप्टान से प्रति किलो बीज को उपचारित करें।

(नौडल ऑफिसर)