



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं  
(ग्रामीण कृषि मौसम सेवा)

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर- 342003



दिनांक: 22 नवम्बर 2016

जोधपुर

जिले के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र,  
जयपुर से प्राप्त मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान

मौसमी तत्व / दिनांक	23/11/16	24/11/16	25/11/16	26/11/16	27/11/16
वर्षा (मि.मी.)	0	0	0	0	0
अधिकतम तापमान (°सेल्सियस)	33	33	32	32	31
न्यूनतम तापमान (°सेल्सियस)	11	11	10	10	10
बादलों की स्थिति (ओक्टा)	0	0	0	0	1
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) सुबह	60	60	58	58	56
सापेक्षिक आर्द्रता (प्रतिशत) शाम	19	16	16	14	14
हवा की गति (कि.मी/घंटा)	6	9	12	10	11
हवा की दिशा	पूर्व	पूर्व- उत्तर- पूर्व	उत्तर-पूर्व	उत्तर-पूर्व	पूर्व- उत्तर- पूर्व

मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कृषि परामर्श सेवा, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा इस जिले के किसानों को सलाह:

फसल	अवस्था	सलाह
गेहूं	बुवाई	जिन किसान भाईयों ने अभी तक गेहूं की बुवाई नहीं की है वे जल्द से जल्द बुवाई करें। राज-3077, राज-3777, राज-4037 राज-1482 डब्ल्यू.एच-147 व लोक-1 गेहूं की उन्नत किस्मों की बुवाई करें। एक हैक्टेयर की बुवाई के लिए 100-125 किलो बीज का प्रयोग करें तथा बुवाई से पूर्व 2 ग्राम विटावेक्स से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। बुवाई के समय 50 किलो नत्रजन व 60 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टेयर दें।
सरसों	वानस्पतिक	सरसों की फसल में बुवाई के 21-30 दिन बाद प्रथम सिंचाई करें तथा इसी समय 30 किलो ग्राम नत्रजन प्रति हैक्टेयर दें।
चना	वानस्पतिक	चने की फसल में प्रथम सिंचाई बुवाई के 40-50 दिन बाद करें तथा दीमक के नियंत्रण के लिए चार लीटर क्लोरोपायरीफास 20 ई.सी प्रति हैक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें।
मैथी, गाजर, मूली,		किसान भाई मैथी, मूली व गाजर में निराई-गुड़ाई कर खरपतवार निकालें।

(नौडल ऑफिसर)