



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 07-02-2025

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2025-02-07 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2025-02-08	2025-02-09	2025-02-10	2025-02-11	2025-02-12
वर्षा (मिमी)	987.0	987.0	987.0	987.0	987.0
अधिकतम तापमान(से.)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
न्यूनतम तापमान(से.)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	27	28	30	29
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	10	11	12	13	14
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	7	9	10	10	10
पवन दिशा (डिग्री)	15	16	22	24	27
क्लाउड कवर (ओक्टा)	11	12	10	10	14

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 25.0 से 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11.0 से 15.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 10-15 किमी/घंटा रहने की संभावना है। आर्द्रता 26 से 10 प्रतिशत रहने की संभावना है।

### सामान्य सलाहकार:

आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 25.0 से 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 11.0 से 15.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना। हवा की गति 10-15 किमी/घंटा रहने की संभावना है। आर्द्रता 26 से 10 प्रतिशत रहने की संभावना है।

### लघु संदेश सलाहकार:

कुष्माण्ड कुल की ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई हेतु खेत तैयार करें अन्तिम जुताई के समय 20-25 टन देशी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें।

### फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	किसान भाई गेहूँ की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बालियां निकलते समय व दाने की दूधिया अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें।
सरसों	किसान भाई सरसों की फसल में दाना पकते समय बुवाई के 90 दिन बाद सिंचाई करें। फसल में एफिड के कीट के नियंत्रण के लिए मैलाथियान 50 ईसी. सवा लीटर या डाइमिथेट 30 ईसी. 875 मिली लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिडकाव करें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
जीरा	किसान भाई जीरे की फसल में बीज बनने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। जीरे की फसल में फसल में एफिड कीट का प्रकोप दिखाई देने पर नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 ईसी. एक मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या ऐसीफेट 75 एस.पी. 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
	ईसबगोल की फसल में मोयला की रोकथाम के लिए क्लोथियानिडिन 50 डब्ल्यू.डी.जी. कीटनाशी 1 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भेस	पशुओं को थनेला रोग से बचाने के लिए पशु का पूरा दूध पूर्ण हस्त विधि से निकालें।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	दिन का तापमान सामान्य से अधिक होने से फसलों की पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों, सब्जियों, फलों आदि में नमी की कमी के लक्षण दिखने पर समय पर सिंचाई करें।